



Pieprznik jadalny / kurka *Cantharellus cibarius*



Występowanie: od czerwca do listopada, w lasach mieszanych. **Owocnik:** o żółtej barwie; u bardzo młodych wypukły, płaski, później wklęsły, lejkowaty; brzeg podwinięty lub falisto powyginany, u starszych okazów postrzępiony; gładki, nagi, matowy. **Blaszki:** barwy kapelusza; w postaci żyłastych fałd zbiegających na trzon. **Trzon:** tej samej barwy lub nieco jaśniejszy od kapelusza; cylindryczny, zwężający się ku dołowi; pełny; powierzchnia gładka. **Mięsz:** białawy z odcieniem żółtym, jasnożółty; jędrny. **Możliwość popelnienia pomyłki:** z wierzchu tuząco podobna do niejadalnej lisówki pomarańczowej.



Lisówka pomarańczowa *Hygrophoropsis aurantiaca*



Występowanie: częsty. Owocniki pojawiają się jesienią, głównie w lasach iglastych i mieszanych. **Owocnik:** pomarańczowożółty do pomarańczowego. Powierzchnia sucha, miejscami pilśniowa, matowa. Młody nieco wypukły, płaski, potem wklęsły, środkiem zapadnięty, lejkowaty. Brzeg początkowo podwinięty i pofalowany. **Blaszki:** barwy pomarańczowej, cienkie, gęste, wąskie i zbiegające na trzon. **Trzon:** barwy owocnika, nieco bledszy, u podstawy białawy, cienki, równo gruby, nieco rozszerzony ku górze, pełny. **Mięsz:** barwy białawej lub kremowej, niezmienny, w kapeluszu cienki. **Możliwość popelnienia pomyłki:** przypomina pieprznika jadalnego, kurkę (*Cantharellus cibarius*).